

Risikovurdering ved mangel på værnemidler (PBU – Personligt BeskyttelsesUdstyr) til den veterinære branche (Familiedyr)

Indhold

Risikovurdering - Definition	2
Skabelon for Risikoanalysen	3
Risikoanalyse for ambulante patienter.....	4
Ambulante patienter uden tegn på infektion og uden spild af kropssekret	4
Ambulante patienter - mundhuleundersøgelse	5
Ambulante patienter med infektion f.eks. pyoderma, otitis, akutte og kroniske mavesår, infektioner efter operationer, diarré, opkastning, undtagen parvo, HCC	6
Ambulante patienter med infektion f.eks. bakterier med særlig resistens, MRSA, salmonella, parvo, HCC.....	7
Risikoanalyse for Operationspatienter	8
Bløddelskirurgi	8
Rodpåfyldning og omfattende tandekstraktioner.....	9
Risikoanalyse for indlagte patienter	10
Indlagte patienter uden tegn på infektion og uden spild af kropssekret	10
Indlagte patienter - mundhuleundersøgelse.....	11
Indlagte patienter med infektion f.eks. pyoderma, otitis, akutte / kroniske sår, infektioner efter operationer, diarré, opkastning og IVA-patienter	12
Indlagte patienter med infektion f.eks. bakterier med særlig resistens, MRSA, salmonella, parvo, HCC	13

Denne risikovurdering er udarbejdet af repræsentanter fra Distriksveterinärerna, MittNorrlands Djursjukvård, Anicura, Evidensia og VVHF. Dvs kort og godt udpluk af nøglepersoner indenfor veterinært hygiejnearbejde i Sverige

Oversat til dansk af ISO Dyr lægen.



Risikovurdering - Definition

Tabel til bestemmelse af sandsynligheden for smittespredning

Beskrivelse	Niveau	Definition
Frekvens	A	Opstår ofte / kontinuerligt i løbet af levetiden *
Sandsynlighed	B	Opstår flere gange i løbet af levetiden*
Midlertidig	C	Finder sted på et tidspunkt i livet *
Ubetydelig	D	Kan muligvis forekomme i levetiden *
Usandsynligt	E	Forventes ikke at forekomme i løbet af levetiden*

*Den analyserede virksomheds levetid

Tabel til bestemmelse af konsekvens ved smittespredning

Klassifikation	Beskrivelse	Definition
1	Katastrofe	Dødsfald, større varig skade
2	Kritisk	Alvorlig skade / dårligt helbred
3	Marginal	Mindre skade / dårligt helbred
4	Ubetydelig	Ubetydelig påvirkning

Konsekvens af forekomst

Sandsynlighed for at en hændelse forekommer	1 Katastrofe	2 Kritisk	3 Marginal	4 Ubetydelig
Frekvens A	3 - HØJ	2 - MIDDEL	1 - LAV	
Sandsynlighed B				
Midlertidig C				
Ubetydelig D				
Usandsynligt E				

Risikoniveau:

1	LAV	Kræver ingen øjeblikkelig handling
2	MIDDEL	Kræver handling på udvalgte områder
3	HØJ	Kræver øjeblikkelig handling

Skabelon for Risikoanalysen

Nedenstående skabelon anvendes til risikovurderingerne på de efterfølgende sider.

Patientgruppe

Risikobeskrivelse: Risiko for spredning af infektion til patienter og personale i tilfælde af ubegrænset / usikker / ikke-eksisterende adgang til forbrugsvarer.

Sandsynlighed for smittespredning: A=Forekommer ofte, B=Forekommer flere gange, C=Forekommer enkelte gange, D=Kan muligvis forekomme, E=Forventes ikke at forekomme

Konsekvens ved smittespredning: 1=Katastofal, 2=Kritisk, 3=Marginal, 4=Ubetydelig

Risikovurdering: 1=Lav, 2=Mellem, 3=Høj

NR	Risikobeskrivelse - mangel på	Årsag	Sandsynlighed	Konsekvens	Risikoniveau	Handling (Reducer risiko / konsekvens)
1	Sæbe					
2	Hånddesinfektion					
3	Overfladedesinfektion					
4	Usterile handsker					
5	Sterile handsker					
6	Operations kitler					
7	Operations afdækning					
8	Mundbind					
9	Åndedrætsværn					
10	Forklæde af plast					
11	Plastforklæde m/lange ærmer					
12	Klorhexidin sæbe					
13	Klorhexidinsprit					

Risikoanalyse for ambulante patienter

Risikobeskrivelse: Risiko for spredning af infektion til patienter og personale i tilfælde af ubegrænset / usikker / ikke-eksisterende adgang til forbrugsvarer.

Ambulante patienter uden tegn på infektion og uden spild af kropssekret

Sandsynlighed for smittespredning: A=Forekommer ofte, B=Forekommer flere gange, C=Forekommer enkelte gange, D=Kan muligvis forekomme, E=Forventes ikke at forekomme

Konsekvens ved smittespredning: 1=Katastrofal, 2=Kritisk, 3=Marginal, 4=Ubetydelig

Risikovurdering: 1=Lav, 2=Mellem, 3=Høj

NR	Risikobeskrivelse - mangel på	Årsag	Sandsynlighed	Konsekvens	Risikoniveau	Handling (Reducer risiko / konsekvens)
1	Sæbe	Mange leverandører har udsolgt	C	4	1	Brug håndrensemiddel (evt. shampoo) og handsker, hvis de er tilgængelige. Ved manglende adgang intensiveres rengøring og desinfektion af berøringsflader.
2	Hånddesinfektion	Mange leverandører har udsolgt	D	3	1	Hænder vaskes med sæbe og vand i stedet for desinfektion med sprit. Det er vigtigt at smøre hænderne ofte med håndcreme. Ved manglende adgang intensiveres rengøring og desinfektion af berøringsflader.
3	Overfladedesinfektion	Mange leverandører har udsolgt	D	4	1	Grundig rengøring af overfladen med mikrofiber og vand eller engangsklud med rengøringsmiddel (overfladeaktivt, tensidholdigt middel).
4	Usterile handsker	Mange leverandører har udsolgt	E	4	1	Undgå at bære handsker til denne patientgruppe.
5	Forklæde af plast	Mange leverandører har udsolgt	E	4	1	Undgå at bruge et plastik forklæde. Skift arbejdsdragt, hvis det bliver synligt beskidt / behåret.
<p>Kommentar: Risikoniveauet for spredning af infektion vurderes som lavt. Håndvask med sæbe og vand samt rengøring af overflader med mikrofiber og vand / engangsklud med overfladeaktivt middel betragtes som tilstrækkelig for denne patientgruppe.</p>						

Ambulante patienter - mundhuleundersøgelse

Sandsynlighed for smittespredning: A=Forekommer ofte, B=Forekommer flere gange, C=Forekommer enkelte gange, D=Kan muligvis forekomme, E=Forventes ikke at forekomme

Konsekvens ved smittespredning: 1=Katastofal, 2=Kritisk, 3=Marginal, 4=Ubetydelig

Risikovurdering: 1=Lav, 2=Mellem, 3=Høj

NR	Risikobeskrivelse - mangel på	Årsag	Sandsynlighed	Konsekvens	Risikoniveau	Handling (Reducer risiko / konsekvens)
1	Sæbe	Mange leverandører har udsolgt	C	4	1	Brug håndrensemiddel og handsker, hvis de er tilgængelige. Undgå slimhindekontakt, hvis der mangler sæbe. Manglende adgang intensiveres rengøring og desinfektion af berøringsflader.
2	Hånddesinfektion	Mange leverandører har udsolgt	D	3	1	Hænder vaskes med sæbe og vand i stedet for desinfektion med sprit. Det er vigtigt at smøre hænderne ofte med håndcreme. Manglende adgang intensiveres rengøring og desinfektion af berøringsflader.
3	Overfladedesinfektion	Mange leverandører har udsolgt	D	4	1	Grundig rengøring af overfladen med mikrofiber og vand eller engangsklud med rengøringsmiddel (overfladeaktivt middel).
4	Usterile handsker	Mange leverandører har udsolgt	E	4	1	Undgå at bruge handsker til denne patientgruppe, hvis tilgængeligheden af sæbe er god. Undgå at berøre inficerede områder af munden.
5	Forklæde af plast	Mange leverandører har udsolgt	E	4	1	Undgå at bruge et plastforklæde til denne patientgruppe. Skift arbejdsdragt, hvis det bliver synligt beskidt / behåret.

Kommentar: Risikoniveauet for spredning af infektion vurderes som lavt. Håndvask med sæbe og vand samt rengøring af overflader med mikrofiber og vand / engangsklud med overfladeaktivt tensidholdigt middel betragtes som tilstrækkelig. Undgå mundhule undersøgelse, hvis der ikke er nogen indikation - alternativt spørg ejer om at åbne munden.

Ambulante patienter med infektion f.eks. pyoderma, otitis, akutte og kroniske mavesår, infektioner efter operationer, diarré, opkastning, undtagen parvo, HCC

Sandsynlighed for smittespredning: A=Forekommer ofte, B=Forekommer flere gange, C=Forekommer enkelte gange, D=Kan muligvis forekomme, E=Forventes ikke at forekomme

Konsekvens ved smittespredning: 1=Katastofal, 2=Kritisk, 3=Marginal, 4=Ubetydelig

Risikovurdering: 1=Lav, 2=Mellem, 3=Høj

NR	Risikobeskrivelse - mangel på	Årsag	Sandsynlighed	Konsekvens	Risikoniveau	Handling (Reducer risiko / konsekvens)
1	Sæbe	Mange leverandører har udsolgt	C	3	1	Overvej at vaske dine hænder med et andet overfladeaktivt middel, såsom shampoo. Ved manglende adgang intensiveres rengøring og desinfektion af berøringsflader.
2	Hånddesinfektion	Mange leverandører har udsolgt	B	2	2	Hænder vaskes med sæbe og vand i stedet for hånddesinfektion. Det er vigtigt at smøre hænderne ofte med håndcreme. Undgå at berøre det inficerede område med fingrene. Brug peang eller lignende hjælpemidler til behandling af sår. Brug handsker, hvis de er tilgængelige. Overvej at lave handsker af plastikposer. Ved manglende adgang intensiveres rengøring og desinfektion af berøringsflader.
3	Overfladedesinfektion	Mange leverandører har udsolgt	B	3	1	Grundig rengøring af overfladen med mikrofiber og vand eller engangsklud med rengøringsmiddel (overfladeaktivt, tensidholdigt middel). Bed ejer om muligt at dække såret derhjemme. Brug beskyttelsesmateriale inde i undersøgelsesrummet (engangs underlag / tæppe, der vaskes straks efter brug).
4	Unsterile handsker	Mange leverandører har udsolgt	C	3	1	I tilfælde af manglende tilgængelighed, se punkt 1 og 2. Overvej at lave handsker lavet af plastikposer.
5	Forklæde af plast	Mange leverandører har udsolgt	E	4	1	Skift arbejdsdragt, hvis det bliver synligt beskidt / behåret. Reserver et plastforklæde til patienter med barrierepleje og patienter med høj risiko for infektion / risiko for stænk. Brug regnjakke i PVC / polyester, hvis den er tilgængelig.
6	Forklæde i plastik med lange ærmer	Mange leverandører har udsolgt	E	4	1	Skift arbejdsdragt, hvis det bliver synligt beskidt / behåret. Reserver et plastforklæde til patienter med isostationspleje til barrierepleje og patienter med høj risiko for infektion / risiko for stænk. Brug regnjakke i PVC / polyester, hvis den er tilgængelig.
Kommentar: Risikoniveauet for spredning af infektion vurderes som lavt. Tilpas arbejdsgange for at undgå forurening af hænder, arbejdstøj og miljøet.						

Ambulante patienter med infektion f.eks. bakterier med særlig resistens, MRSA, salmonella, parvo, HCC

Sandsynlighed for smittespredning: A=Forekommer ofte, B=Forekommer flere gange, C=Forekommer enkelte gange, D=Kan muligvis forekomme, E=Forventes ikke at forekomme

Konsekvens ved smittespredning: 1=Katastofal, 2=Kritisk, 3=Marginal, 4=Ubetydelig

Risikovurdering: 1=Lav, 2=Mellem, 3=Høj

NR	Risikobeskrivelse - mangel på	Årsag	Sandsynlighed	Konsekvens	Risikoniveau	Handling (Reducer risiko / konsekvens)
1	Sæbe	Mange leverandører har udsolgt	C	2	2	Overvej alternativt beskyttelsesudstyr (plastikposer, skraldeposer). Overvej henvisning til et plejefacilitet, der har beskyttelsesudstyr. Ved manglende adgang intensiveres rengøring og desinfektion af berøringsflader.
2	Hånddesinfektion	Mange leverandører har udsolgt	B	2	2	Hænder vaskes med sæbe og vand i stedet for hånddesinfektion. Det er vigtigt at smøre hænderne ofte med håndcreme. Brug handsker, hvis de er tilgængelige. Undgå at forurene dine hænder med afføring. Overvej alternativt beskyttelsesudstyr (plastikposer). Manglende adgang intensiveres rengøring og desinfektion af berøringsflader.
3	Overfladedesinfektion	Mange leverandører har udsolgt	B	3	2	Grundig rengøring af overfladen med mikrofiber og vand eller engangsklud med rengøringsmiddel (overfladeaktivt middel). Prioriter overfladedesinfektion til denne patientgruppe. Husk at bruge et desinfektionsmiddel, der påvirker mistænkte stoffer.
4	Usterile handsker	Mange leverandører har udsolgt	C	3	1	I tilfælde af manglende tilgængelighed, se punkt 1 og 2. Overvej at lave handsker lavet af plastikposer.
5	Forklæde af plast	Mange leverandører har udsolgt	C	3	1	Prioritér plastforklæde til denne patientgruppe. I tilfælde af total mangel, skal du overveje alternativt beskyttelsesudstyr (f.eks. Plastikposer / skraldeposer / regnjakke i PVC / polyester). Skift arbejdsuniform i tilfælde af patientkontakt. Bortskaf tøj straks.
6	Forklæde af plast m/ lange ærmer	Mange leverandører har udsolgt	C	3	1	Prioritér plastforklæde til denne patientgruppe. I tilfælde af total mangel, skal du overveje alternativt beskyttelsesudstyr (f.eks. Skraldeposer, regnjakke i PVC / polyester). Skift arbejdsdragt efter patientkontakt. Bortskaf tøj straks.
7	Mangel på veterinært sundhedspersonale	Sygeorlovs-personale	D	4	1	Erfarne veterinærsygeplejersker har lov til at behandle patienten med mistanke om zoonose.
Kommentar: Risikoniveauet for spredning af infektion vurderes som moderat. Overvej arbejdsgang og at bruge alternativt beskyttelsesudstyr.						

Risikoanalyse for Operationspatienter

Bløddelskirurgi

Sandsynlighed for smittespredning: A=Forekommer ofte, B=Forekommer flere gange, C=Forekommer enkelte gange, D=Kan muligvis forekomme, E=Forventes ikke at forekomme

Konsekvens ved smittespredning: 1=Katastofal, 2=Kritisk, 3=Marginal, 4=Ubetydelig

Risikovurdering: 1=Lav, 2=Mellem, 3=Høj

NR	Risikobeskrivelse - mangel på	Årsag	Sandsynlighed	Konsekvens	Risikoniveau	Handling (Reducer risiko / konsekvens)
1	Sæbe	Mange leverandører har udsolgt	C	3	1	Vask dine hænder med et andet overfladeaktivt middel, såsom shampoo.
2	Hånddesinfektion	Mange leverandører har udsolgt	D	3	1	Hånddesinfektion godkendt i henhold til EN1500 er tilstrækkelig ved mangel. Overvej brugen af klorhexidinsæbe i tilfælde af manglende hånddesinfektion. I mangel af klorhexidin sæbe, overvej at udsætte ikke-akutte operationer.
3	Overfladedesinfektion	Mange leverandører har udsolgt	D	3	1	Grundig rengøring af overfladen med mikrofiber og vand eller engangsklud med rengøringsmiddel (overfladeaktivt/tensidholdigt middel).
4	Usterile handsker	Mange leverandører har udsolgt	D	3	1	Tilpas arbejdsmetoden; Brug alternativt beskyttelsesudstyr, såsom plastposer, ved forvask. Bed EJER om at vaske (shampoo) hunden derhjemme dagen før operationen.
5	Sterile handsker	Mange leverandører har udsolgt	A	2	3	Forudsat at hænderne er vasket og desinficeret, og at der anvendes god operations teknik. Overvej perioperativ antibiotika.
6	Operations forklæder	Mange leverandører har udsolgt	C	3	1	Brug genanvendelige kitler, hvis de er tilgængelige. Tilpas den måde, du arbejder på, brug rent arbejdstøj, tænk på din kroppspositionering. Overvej perioperativ antibiotika.
7	Operations afdækning	Mange leverandører har udsolgt	C	2	2	Klip og vask operationsområdet med en bred margin. Brug genanvendelig afdækning, hvis de findes. Risikovurderingen er baseret på adgang til genanvendelig afdækning. I tilfælde af mangel på afdækning, kan man overveje at udskyde ikke-akutte operationer.
8	Mundbind	Mange leverandører har udsolgt	D	3	1	Begræns samtale i operationsstuen. Overvej at lave dine egne mundbind. Overvej at udskyde ikke-akutte operationer.
9	Forklæde af plast	Mange leverandører har udsolgt	E	4	1	Skift arbejdsdragt i tilfælde af synlig forurening.
10	Klorhexidin sæbe	Mange leverandører har udsolgt	D	2	2	Brug almindelig sæbe eller shampoo.
11	Klorhexidinsprit	Mange leverandører har udsolgt	D	2	2	Overvej alternative desinfektionsmidler, såsom 70% hospitalssprit, jodopløsning.
Kommentar: Risikoen vurderes som moderat. Overvej perioperativ antibiotika og udsættelse af ikke-akutte operationer.						

Rodpåfyldning og omfattende tandekstraktioner

Sandsynlighed for smittespredning: A=Forekommer ofte, B=Forekommer flere gange, C=Forekommer enkelte gange, D=Kan muligvis forekomme, E=Forventes ikke at forekomme

Konsekvens ved smittespredning: 1=Katastofal, 2=Kritisk, 3=Marginal, 4=Ubetydelig

Risikovurdering: 1=Lav, 2=Mellem, 3=Høj

NR	Risikobeskrivelse - mangel på	Årsag	Sandsynlighed	Konsekvens	Risikoniveau	Handling (Reducer risiko / konsekvens)
1	Sæbe	Mange leverandører har udsolgt	E	4	1	Vask dine hænder med et andet overfladeaktivt middel, såsom shampoo.
2	Hånddesinfektion	Mange leverandører har udsolgt	D	3	1	Hænder vaskes med sæbe og vand i stedet for desinfektion med håndsprit. Det er vigtigt at smøre hænderne ofte med håndcreme. Manglende adgang intensiverer rengøring og desinfektion af berøringsflader.
3	Overfladedesinfektion	Mange leverandører har udsolgt	E	4	1	Grundig rengøring af overfladen med mikrofiber og vand eller engangsklud med rengøringsmiddel (overfladeaktivt, tensidholdigt middel).
4	Usterile handsker	Mange leverandører har udsolgt	E	4	1	Tilpas arbejdsmetoden; Brug alternativt beskyttelsesudstyr, såsom plastposer, ved forvask.
5	Sterile handsker	Mange leverandører har udsolgt	B	3	2	Forudsat at hænderne er vasket og desinficeret, og at der anvendes god operations teknik.
6	Mundbind	Mange leverandører har udsolgt	E	4	1	Overvej at lave dine egne mundbind.
7	Forklæde af plast	Mange leverandører har udsolgt	E	4	1	Skift arbejdsdragt i tilfælde af synlig forurening.
Kommentar: Risikoniveauet for spredning af infektion anses for lavt og ubetydeligt for tandrensninger og enkle tandekstraktioner.						

Risikoanalyse for indlagte patienter

Risikobeskrivelse: Risiko for spredning af infektion til patienter og personale i tilfælde af ubegrænset / usikker / ikke-eksisterende adgang til forbrugsvarer.

Indlagte patienter uden tegn på infektion og uden spild af kropsekret

Sandsynlighed for smittespredning: **A**=Forekommer ofte, **B**=Forekommer flere gange, **C**=Forekommer enkelte gange, **D**=Kan muligvis forekomme, **E**=Forventes ikke at forekomme

Konsekvens ved smittespredning: **1**=Katastofal, **2**=Kritisk, **3**=Marginal, **4**=Ubetydelig

Risikovurdering: **1**=Lav, **2**=Mellem, **3**=Høj

NR	Risikobeskrivelse - mangel på	Årsag	Sandsynlighed	Konsekvens	Risikoniveau	Handling (Reducer risiko / konsekvens)
1	Sæbe	Mange leverandører har udsolgt	C	4	1	Brug håndrensemiddel (evt. shampoo) og handsker, hvis de er tilgængelige. Ved mangelsituationer intensiveres rengøring og desinfektion af berøringsflader.
2	Hånddesinfektion	Mange leverandører har udsolgt	D	3	1	Hænder vaskes med sæbe og vand i stedet for desinfektion med sprit. Det er vigtigt at smøre hænderne ofte med håndcreme. Ved mangelsituationer intensiveres rengøring og desinfektion af berøringsflader.
3	Overfladedesinfektion	Mange leverandører har udsolgt	D	4	1	Grundig rengøring af overfladen med mikrofiber og vand eller engangsklud med rengøringsmiddel (tensidholdigt rengøringsmiddel).
4	Usterile handsker	Mange leverandører har udsolgt	E	4	1	Undgå at bære handsker til denne patientgruppe.
5	Forklæde af plast	Mange leverandører har udsolgt	E	4	1	Undgå at bruge et plastik forklæde. Skift arbejdsdragt, hvis det bliver synligt beskidt / behåret.
<p>Kommentar: Risikoniveauet for spredning af infektion vurderes som lavt. Håndvask med sæbe og vand samt rengøring af overflader med mikrofiber og vand / engangsklud med overfladeaktivt middel betragtes som tilstrækkelig for denne patientgruppe.</p>						

Indlagte patienter - mundhuleundersøgelse

Sandsynlighed for smittespredning: A=Forekommer ofte, B=Forekommer flere gange, C=Forekommer enkelte gange, D=Kan muligvis forekomme, E=Forventes ikke at forekomme

Konsekvens ved smittespredning: 1=Katastofal, 2=Kritisk, 3=Marginal, 4=Ubetydelig

Risikovurdering: 1=Lav, 2=Mellem, 3=Høj

NR	Risikobeskrivelse - mangel på	Årsag	Sandsynlighed	Konsekvens	Risikoniveau	Handling (Reducer risiko / konsekvens)
1	Sæbe	Mange leverandører har udsolgt	C	4	1	Brug håndrensemiddel (evt. shampoo) og handsker, hvis de er tilgængelige. Undgå slimhindekontakt, hvis der mangler sæbe. Ved mangelsituationer intensiveres rengøring og desinfektion af berøringsflader.
2	Hånddesinfektion	Mange leverandører har udsolgt	D	4	1	Hænder vaskes med sæbe og vand i stedet for desinfektion med sprit. Det er vigtigt at smøre hænderne ofte med håndcreme. Manglende adgang intensiverer rengøring og desinfektion af berøringsflader.
3	Overfladedesinfektion	Mange leverandører har udsolgt	D	4	1	Grundig rengøring af overfladen med mikrofiber og vand eller engangsklud med rengøringsmiddel (tensidholdigt middel).
4	Usterile handsker	Mange leverandører har udsolgt	E	4	1	Undgå at bruge handsker til denne patientgruppe, hvis tilgængeligheden af sæbe er god. Undgå at berøre inficerede områder af munden.
5	Forklæde af plast	Mange leverandører har udsolgt	E	4	1	Undgå at bruge et plastforklæde til denne patientgruppe i tilfælde af mangel. Skift arbejdsdragt, hvis det bliver synligt beskidt / behåret.
<p>Kommentar: Risikoniveauet for spredning af infektion vurderes som lavt. Håndvask med sæbe og vand samt rengøring af overflader med mikrofiber og vand / engangsklud med overfladeaktivt middel betragtes som tilstrækkelig. Undgå mundhule undersøgelse, hvis der ikke er nogen indikation.</p>						

Indlagte patienter med infektion f.eks. pyoderma, otitis, akutte / kroniske sår, infektioner efter operationer, diarré, opkastning og IVA-patienter

Sandsynlighed for smittespredning: A=Forekommer ofte, B=Forekommer flere gange, C=Forekommer enkelte gange, D=Kan muligvis forekomme, E=Forventes ikke at forekomme

Konsekvens ved smittespredning: 1=Katastofal, 2=Kritisk, 3=Marginal, 4=Ubetydelig

Risikovurdering: 1=Lav, 2=Mellem, 3=Høj

N R	Risikobeskrivelse - mangel på	Årsag	Sandsynlighed	Konsekvens	Risikoniveau	Handling (Reducer risiko / konsekvens)
1	Sæbe	Mange leverandører har udsolgt	C	3	1	Overvej at vaske dine hænder med et andet overfladeaktivt middel, såsom shampoo. Ved mangel intensiveres rengøring og desinfektion af berøringsflader.
2	Hånddesinfektion	Mange leverandører har udsolgt	B	2	2	Hænder vaskes med sæbe og vand i stedet for hånddesinfektion. Det er vigtigt at smøre hænderne ofte med håndcreme. Undgå at berøre det inficerede område med fingrene. Forsøg at anvende peang eller lignende hjælpemidler til behandling af sår. Brug handsker, hvis de er tilgængelige. Overvej at bruge plastikposer som beskyttelse i tilfælde af mangel på handsker.
3	Overfladedesinfektion	Mange leverandører har udsolgt	B	2	2	Brug de tilgængelige desinfektionsmidler. Brug et engangsunderlag ved behandling (alternativt tæppe, der vaskes straks efter brug).
4	Usterile handsker	Mange leverandører har udsolgt	E	4	1	I tilfælde af manglende adgang, se punkt 1 og 2. Overvej at lave handsker af plastikposer.
5	Sterile handsker					Se fanebladet "Operationspatienter" (nederst på skærmbilledet) for behandling af f.eks. postoperative sårinfektioner
6	Operations forklæder					Se fanebladet "Operationspatienter" (nederst på skærmbilledet) for behandling af f.eks. postoperative sårinfektioner
7	Operations afdækning					Se fanebladet "Operationspatienter" (nederst på skærmbilledet) for behandling af f.eks. postoperative sårinfektioner
8	Forklæde af plast	Mange leverandører har udsolgt	E	4	1	Skift arbejdsdragt, hvis det bliver synligt beskidt / behåret. Reservér et plastforklæde til patienter i intensiv afdeling og patienter med høj risiko for smitteoverførsel / risiko for stænk. Brug regnjakke i PVC / polyester, hvis den er tilgængelig.
9	Forklæde af plast m/ lange ærmer	Mange leverandører har udsolgt	E	4	1	Skift arbejdsdragt, hvis det bliver synligt beskidt / behåret. Reservér et plastforklæde til patienter med isostationspleje til barrierepleje og patienter med høj risiko for infektion / risiko for stænk. Brug regnjakke i PVC / polyester, hvis den er tilgængelig.
10	Klorhexidin sæbe					Se fanebladet "Operationspatienter" (nederst på skærmbilledet) for behandling af f.eks. postoperative sårinfektioner
11	Klorhexidinsprit					Se fanebladet "Operationspatienter" (nederst på skærmbilledet) for behandling af f.eks. postoperative sårinfektioner

Kommentar: Risikoniveauet for infektionsspredning vurderes som lav-moderat. Tilpas arbejdsmetoden for at undgå forurening af hænder, arbejdstøj og miljøet.

Indlagte patienter med infektion f.eks. bakterier med særlig resistens, MRSA, salmonella, parvo, HCC

Sandsynlighed for smittespredning: A=Forekommer ofte, B=Forekommer flere gange, C=Forekommer enkelte gange, D=Kan muligvis forekomme, E=Forventes ikke at forekomme

Konsekvens ved smittespredning: 1=Katastofal, 2=Kritisk, 3=Marginal, 4=Ubetydelig

Risikovurdering: 1=Lav, 2=Mellem, 3=Høj

N R	Risikobeskrivelse - mangel på	Årsag	Sandsynlighed	Konsekvens	Risikoniveau	Handling (Reducer risiko / konsekvens)
1	Sæbe	Mange leverandører har udsolgt	C	2	2	Overvej at bruge alternativt beskyttelsesudstyr (plastikposer i stedet for handsker) og vask hænderne med et andet overfladeaktivt middel, såsom shampoo.
2	Hånddesinfektion	Mange leverandører har udsolgt	B	2	2	Hænder vaskes med sæbe og vand i stedet for hånddesinfektion. Det er vigtigt at smøre hænderne ofte med håndcreme. Brug handsker, hvis de er tilgængelige. Overvej at bruge plastikposer som beskyttelse i tilfælde af mangel på handsker.
3	Overfladedesinfektion	Mange leverandører har udsolgt	B	3	2	Grundig rengøring af overfladen med mikrofiber og vand eller engangsklud med rengøringsmiddel (overfladeaktivt middel). Prioriter overfladedesinfektion til denne patientgruppe. Brug desinfektionsmidlet, der er tilgængeligt og har en virkning mod mistænkte stoffer.
4	Usterile handsker	Mange leverandører har udsolgt	E	4	1	I tilfælde af manglende tilgængelighed, se punkt 1 og 2. Overvej brugen af alternativt beskyttelsesudstyr som f.eks. plastikposer.
5	Forklæde af plast	Mange leverandører har udsolgt	C	3	1	Prioritér plastforklæde til denne patientgruppe. I tilfælde af total mangel, overvej brugen af alternativt beskyttelsesudstyr (f.eks. plastikposer / skraldeposer / regnjakke i PVC / polyester). Bortskaf tøj straks.
6	Forklæde i plastik med lange ærmer	Mange leverandører har udsolgt	C	3	1	Prioritér plastforklæde til denne patientgruppe. I tilfælde af total mangel, skal du overveje alternativt beskyttelsesudstyr (f.eks. skraldeposer, regnjakke i PVC / polyester). Skift arbejdsdragt efter patientkontakt. Bortskaf tøj straks.
7	Mangel på veterinært sundhedspersonale	Sygeorlovs-personale	D	4	1	Erfarne veterinærsygeplejersker har lov til at behandle patienten med mistanke om zoonose.

Kommentar: Risikoniveauet for spredning af infektion vurderes som moderat. Overvej arbejdsgang og at bruge alternativt beskyttelsesudstyr. I tilfælde af stor mangel på beskyttelsesudstyr skal du overveje henvisning til en klinik, der har beskyttelsesudstyr.