

Anbefaling omkring

Medicin (Holdbarhed efter anbrud)

Godkendt af Kvalitetsudvalget
Marts 2015

Anbefaling:

Dato for anbrud på alle injektionspræparater påføres flasken. Det forsøges altid at anvende flasken inden 28 dage efter anbrud. Medicin, som kun anvendes i mindre omfang og hvor det er vanskeligt at anvende hele flasken indenfor 28 dage, bør kun åbnes i ét eksemplar (for at reducere/undgå spild). Medicinens påførte sidste anvendelsesdato overholdes og destrueres når denne dato overskrides.

Øvrige injektionspræparater kan efter anbrud anvendes indtil dato for udløb, såfremt dyrlægen vurderer, at det er veterinærfagligt forsvarligt. Rester destrueres efter udløb. Alt udløbet medicin destrueres. Der tjekkes jævnligt for dato-udløbet medicin.

Baggrund:

På foranledning af medlemshenvendelser har Bestyrelsen for SvHKS undersøgt reglerne i forbindelse med udløbsdato på medicin. Der er ikke en egentlig lov på området. Man skal som dyrlæge altid handle med omhu og samvittighedsfuldhed og man kan ved tilsidesættelse af dette blive anklaget efter Dyrlægeloven. Man kan ligeledes pådrage sig en ansvarssag, hvis et dyr får utilsigtede bivirkninger ved brug af for gammel medicin og klienten retter klage.

Yderligere:

Praksis kan ved udarbejdelse af liste over holdbarhed (efter anbrud) på den anvendte injektionsmedicin, sikre et hurtigt overblik over holdbarhed for de enkelte præparater. Det er altid den enkelte praksis og dermed den behandlende dyrlæges ansvar at sikre en korrekt anvendelse og håndtering af medicin. Samtidig skal det naturligvis sikres, at medicin opbevares korrekt (bl.a. ved korrekt temperatur) og hygiejnisk (dette er også ét af det Veterinære Rejseholds fokusområder).

EKSEMPEL på liste over holdbarhed på anbrudt medicin – se side 2

Det er den enkelte praksis' ansvar at sikre procedure for håndtering af medicin, herunder korrekt oversigt over holdbarhed på anbrudt medicin.

Eksempel på liste over holdbarhed på anbrudt medicin

(Eksempel fra Dyrlægehuset Skanderborg, udarbejdet af Dyrlæge Dorte Jørgensen):

Medicinliste injektionspræparater:

- **Adrenalin:** Opbevares 2-8 grader i køleskab. Ampullerne må opbevares op til 6 mdr. ved højst 25 grader. Skal opbevares beskyttet mod lys. Åbne ampuller kasseres straks efter brug.
- **Alizin vet :** Anvendes inden 28 dage efter anbrud, beskyttet mod sollys, 15-25 grader
- **Antisedan:** Anvendes inden 28 dage efter anbrud, 15-25 grader. Beskyttet mod sollys
- **Atropin:** Opbevares 15-25 grader.
- **Baytril:** Opbevares 15-25 grader.
- **Bricanyl:** Ampuller anvendes umiddelbart efter anbrud, rester kasseres
- **Calmivet:** Anvendes inden 28 dage efter anbrud
- **Ca-gluconat 10%:** Åbne ampuller anvendes umiddelbart efter anbrud og rester kasseres.
- **Cerenia:** Anvendes inden 28 dage efter anbrud, opbevares i køleskab
- **Comfortan:** Anvendes inden 28 dage efter anbrud, beskyttet mod sollys
- **Depomedrol:** Opbevares 15-25 grader
- **Dexdomitor:** Anvendes inden 28 dage efter anbrud, 15-25 grader
- **Dimazon:** Opbevares 15-25 grader
- **Domitor:** Anvendes inden 28 dage efter anbrud, 15-25 grader
- **Dopram:** Anvendes inden 28 dage efter anbrud.
- **Euthasol/Exagon vet:** Anvendes inden 28 dage efter anbrud, skal opbevares < 25 grader (ikke frost) efter anbrud og beskyttet mod sollys
- **FMP:** Opbevares 15-25 grader
- **Iso-flo:** Opbevares < 25 grader, stramt tillukket og ikke i direkte sollys.
- **Ketaminol:** Anvendes inden 28 dage efter anbrud, opbevares i køleskab.
- **Metacam 2 mg/ml og 5 mg/ml:** Anvendes inden 28 dage efter anbrud.
- **Noromox prolongatum:** Opbevares 15-25 grader
- **Oxybuprokain øjendråber 4 mg/ml:** Må anvendes 1 måned efter åbning.
- **Oxytocin:** Anvendes inden 28 dage efter anbrud. Opbevares i køleskab.
- **Plegicil:** Opbevares 15-25 grader.
- **Program Vet-inj:** Opbevares frostfrit.
- **Propovet multidose:** Anvendes inden 28 dage efter anbrud, opbevares < 25 grader
- **Rompun:** Opbevares < 30 grader.
- **Stesolid:** Ampuller anvendes umiddelbart efter anbrud, rester kasseres.
- **Synacthen:** Opbevares på køl, anvendes umiddelbart efter anbrud, rester kasseres
- **Torbugesic:** Opbevares 15-25 grader
- **Vacciner:** Opbevares i køleskab 2-8 C, vaccinerne tages ud umiddelbart før de anvendes
- **Vetergesic:** Anvendes inden 28 dage efter anbrud. Opbevares mørkt og < 25 grader.
- **Zoletil-blanding:** Holdbar 6-8 uger efter blanding, kasseres efter 8 uger, opbevares i køleskab 2-8 C og beskyttet mod sollys.