

”Kvik-guide” til Hygiejnehåndbogen

Veterinær praksishygiejne omhandler hygiejnebefalinger indenfor alle dele af praksis. Oftest er det risikoen for postoperative infektioner, der først tænkes på, men mangelfuld hygiejne kan medføre risiko for smitte på mange andre niveauer. Derfor er der i regi af Faggruppe Familiedyr udarbejdet en Hygiejnehåndbog, som har til formål at sætte fokus på hygiejneprocedurer, som kan forhindre smitte fra miljø til patient, patient til patient, patient til menneske (personale, dyreejer) samt smitte mel

For at gøre det endnu nemmere at vælge det rette produkt, samt metode og dosis m.v. er dette tillæg til hygiejnehåndbogen udarbejdet med de forskellige leverandørers anbefalinger til de forskellige rengøringsopgaver. Disse anbefalinger er tilføjet i tabel 3 & 4 fra Hygiejnehåndbogen.



Tabel 3: Anbefalede rengøringsprocedurer for almindelige overflader

Overflade:	Procedurer:	Særlige overvejelser	Leverandør anbefaling (produkt, metode, dosering, kontakttid, temperaturafhængighed, behov for PPE m.m. + risikovurdering & sikkerhedsdatablad)
Horisontale overflader med lav patientkontakt (f.eks. reception)	Rengør regelmæssigt med rengøringsmiddel, f.eks. hver anden uge Rengør og desinficer straks, hvis der er synligt snavs, fæces, urin eller kropsvæsker		<p><u>Abena:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Rengøring af flader: 160534 Rengøring og desinfektion ved synlig snavs med fæces m.m.: 1000009104 (engangsmoppe med klor) <p><u>Equidan Vetline:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Vet UltraDes</u>, for generel rengøring, brug 1% opløsning, kontakttid 5 minutter (se produktblad for yderligere info). Ingen efterskylning, brug handsker ved håndtering af koncentrat.
Horisontale overflader med høj patientkontakt (f.eks. konsultationsborde, vægte, burrum)	Rengør overfladen for synligt snavs og desinficer mellem alle patienter. Der skal være tilstrækkelig kontakttid i henhold til anvisningerne på etiketten. Ved højrisikopatienter (f.eks. diarré) skal der anvendes et højere desinfektionsniveau (f.eks. klorin eller Virkon S).	Se Tabel 5 og 6 for valg af passende rengørings- og desinfektionsmidler Elektrostatisk klude (f.eks. Swiffer™ klude) kan bruges til at fjerne løs pels og støv	<p><u>Abena:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Desinfektion med ethanol: 160613, 150667 Høj desinfektionsniveau: 160549 <p><u>Equidan Vetline:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Vet UltraDes</u>, for rengøring og desinfektion, brug 3% opløsning, kontakttid 15 minutter (se produktblad for yderligere info). Ingen efterskylning, brug handsker ved håndtering af koncentrat.
Lodrette overflader (f.eks. vægge, døre, vinduer, herunder)	Rengør regelmæssigt med et rengøringsmiddel, f.eks. månedligt		<p><u>Abena:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Rengøring af kontakt punkter: wet wipe universal: 160534 Rengøring og desinfektion ved synlig snavs med fæces m.m.: 1000009104 (engangsmoppe med klor)

Overflade:	Procedurer:	Særlige overvejelser	Leverandør anbefaling (produkt, metode, dosering, kontaktid, temperaturafhængighed, behov for PPE m.m. + risikovurdering & sikkerhedsdatablad)
også persiener & gardiner)	Rengør og desinficer, hvis der er synligt snavset med fæces, urin eller kropsvæsker		<u>Equidan Vetline:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Vet UltraDes, for generel rengøring, brug 1% opløsning, kontaktid 5 minutter (se produktblad for yderligere info). Ingen efterskylning, brug handsker ved håndtering af koncentrat.
Hårdt gulv (f.eks. fliser, træ, forsejlet cement)	Rengør dagligt med et rengøringsmiddel. Desinficer regelmæssigt, f.eks. ugentligt Rengør og desinficer efter potentielt infektiøse patienter Rengør og desinficér, hvis der er synligt snavset med fæces, urin eller kropsvæsker		<u>Abena:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Desinfektion ved synlig snavs af fæces m.m: 1000009104 (engangsmoppe med klor) <u>Equidan Vetline:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Vet UltraDes, for generel rengøring, brug 1% opløsning, kontaktid 5 minutter (se produktblad for yderligere info). Ingen efterskylning, brug handsker ved håndtering af koncentrat.
Tæpper / polstring	Støvsug regelmæssigt, f.eks. ugentlig til månedligt <u>Bemærk:</u> Medmindre støvsugeren er udstyret med et HEPA-filter, må støvsugning ikke foretages, hvis gulvtæppet har været i kontakt med en patient smittet med et infektiøst patogen (f.eks ringorm) Brug sæbe eller damprens om nødvendigt for at fjerne synligt snavs eller organiske stoffer.		

Tabel 4: Spaulding's (1970) klassificering af medicinsk udstyr / instrumenter og krav til niveauer til behandling og opbevaring

Klassifikation	Definition	Niveau for behandling /oparbejdning	Leverandør anbefaling (produkt, metode, dosering m.m. + risikovurdering & sikkerhedsdatablad)
Kritisk udstyr / instrument (f.eks. Kirurgiske instrumenter)	Udstyr / instrumenter, der anvendes i sterilt væv, herunder intravaskulært.	Rengøring efterfulgt af sterilisering	<p><u>Equidan Vetline:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Medaprotect, instrumentdesinfektion, 1% opløsning, i åbent bad eller ultralydsrens, kontakttid 15-30 min. (se produktblad for yderligere info). Efterskylning i sterilt vand. Handsker og øjenbeskyttelse anbefales.
Semikritisk udstyr / enhed (f.eks. Endoskoper, termometre)	Udstyr / instrument, der kommer i kontakt med ikke-intakt hud eller slimhinder, men ikke trænger igennem dem	Rengøring efterfulgt af desinfektion på højt niveau (som et minimum), sterilisering foretrækkes hvis udstyret eller instrumenterne tillader det.	<p><u>Equidan Vetline:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Medaprotect, instrumentdesinfektion, 1% opløsning, i åbent bad eller ultralydsrens, kontakttid 15-30 min. (se produktblad for yderligere info). Efterskylning i sterilt vand. Handsker og øjenbeskyttelse anbefales.
Ikke-kritisk udstyr / enhed (f.eks. Stetoskop)	Udstyr / anordning, der kun berører intakt hud, ikke slimhinder eller ikke direkte berører patienten	Rengøring efterfulgt af lavt niveau desinfektion, i nogle tilfælde er rengøring alene acceptabelt	<p><u>Abena:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Desinfektion (ethanol): 150800, 150149, 150667 <p><u>Equidan Vetline:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vet UltraDes, for generel rengøring, brug 1% opløsning, kontakttid 5 minutter (se produktblad for yderligere info). Ingen efterskylning, brug handsker ved håndtering af koncentrat.